




Máxima protección para el almendro



Flecha Suprem[®]

Fungicida polivalente para el control eficaz de las principales enfermedades del almendro.

Consulte a su distribuidor
ASCENZA o visite
www.ascenza.es



ASCENZA[®]
— FARMING YOUR FUTURE —



Asegura la producción de tus almendros


FLECHA SUPREM combina dos principios activos sinérgicos y complementarios: kresoxim-metil y difenoconazol, una solución innovadora con modos de acción diferentes, que promueve el correcto manejo de resistencias, y garantiza el control eficaz de las principales enfermedades fúngicas del almendro.

Diferentes modos de acción, protección más prolongada

FLECHA SUPREM evita que se produzca la infección de la enfermedad interfiriendo en las primeras etapas del desarrollo del hongo, como son la germinación de esporas y la formación del apresorio. Además, obstruye la formación de haustorios y disminuye la producción de esporas y su viabilidad.

FLECHA SUPREM posee:

- Potente actividad sistémica: tras su aplicación se distribuye homogéneamente hacia el interior de la planta por movimiento translaminar.
- Elevada afinidad por la cutícula cerosa de los tejidos vegetales: hace que se mantenga en la superficie aplicada, desde donde se redistribuye, a la vez que libera vapor que circula alrededor y a través de la hoja.
- Alta resistencia al lavado por lluvias: confiere una protección más duradera a la planta.



Recomendaciones de uso:

Se recomienda aplicar **FLECHA SUPREM** en los tratamientos preventivos, en las primeras fases de desarrollo de las enfermedades a la dosis de 0.3 kg/Ha, realizando dos aplicaciones con 15 días de intervalo entre ambas.



Momentos de aplicación:

■ La ventana de aplicaciones de **FLECHA SUPREM** en almendro es muy amplia, desde la apertura de las yemas (BBCH 53) hasta que los frutos alcanzan alrededor del 90 % del tamaño varietal final (BBCH 79).

■ Para Mancha ocre (*Polystigma amygdalinum*) se recomienda aplicar **FLECHA SUPREM** desde el inicio de la caída de pétalos, (momento clave en la evolución del hongo y, por tanto, para su control), hasta el desarrollo del fruto, ya que los nuevos crecimientos vegetativos deben quedar protegidos.

■ **FLECHA SUPREM** es efectivo para combatir otras enfermedades tan importantes como la Monilinia (*Monilia Laxa*), para cuyo control se aconseja efectuar una primera aplicación en el inicio de la floración (20 % de flores abiertas), y la siguiente intervención en caída de pétalos (ó al 80 % de flores abiertas en variedades muy sensibles a la enfermedad).

■ **FLECHA SUPREM** tiene acción sobre otras enfermedades del almendro: *Antracnosis*, *Cribado* y *Roya*.



VENTAJAS:

- Período de aplicación amplio y flexible
- Acción contra las principales enfermedades del almendro
- Ataca al hongo en todas las fases de su ciclo
- Modos de acción diferentes y complementarios
- Adecuado para el control de resistencias
- Resistencia al lavado por lluvias posteriores al tratamiento
- Formulación WG con tecnología WG ADVANCE, práctica y segura para el aplicador
- Fácil dosificación



Flecha Suprem[®]

Dosis por cultivo y momento de aplicación:

Cultivo	Plaga/efecto	Dosis	Volumen	Nº trat.	Estado de crecimiento	Intervalo entre aplicaciones	P.S.
Almendo	Roña (Moteado) Mancha Ocre	0.25-0.3 kg/ha	500-1000	1-2	Aplicar desde la apertura de las yemas hasta que los frutos alcanzan el 90% del tamaño varietal final BBCH 53-79	15 días	NP
Manzano	Moteado <i>Venturia inaequalis</i>			1-2	Aplicar desde la apertura de las yemas hasta que los frutos alcanzan el 90% del tamaño varietal final BBCH 53-79	15 días	
Peral	Moteado <i>Venturia pyrina</i>			1-2	Aplicar desde la apertura de las yemas hasta que los frutos alcanzan el 90% del tamaño varietal final BBCH 53-79	15 días	35 días
	Mancha negra <i>Stemphylium vesicarium</i>			3	Aplicar desde la BBCH 65 -79	14 días	
Olivo	Repilo <i>Fusicladium oleagineum</i>			2	Aplicar en primavera BBCH 50-59, durante el desarrollo de la inflorescencia y antes de la aparición de las primeras flores	14 días	NA

COMPOSICIÓN: Kresoxim-metil 25% + Difenconazol 12,5%

FORMULACIÓN: Gránulo dispersable en agua (WG)

ENVASE: 600 gramos

Nº DE REGISTRO: ES-00260

INDICACIONES: Según indicaciones de FRAC para evitar el desarrollo de resistencias, se aconseja alternar con fungicidas que tengan modos de acción diferentes.



ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA, S.A.U.
Parque Empresarial Táctica C/Botiguers 3, 4º Planta 46980 PATERNA (Valencia)
Tel: 961 34 51 50 - Fax: 961 34 35 10 - www.ascenza.es

