





GOBIERNO DE ESPAÑA



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

22423

BELTHIRUL

SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

|                   |                                                                                                                                                                            |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Almendro          | Arrollador, cigarrero, Archips spp.<br>Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella<br>Oruga de librea, Malacosoma neustria<br>Polilla oriental, Grapholita molesta |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                   | Viejecita, Orgyia antiqua                                                                                                                                                  | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 2 | 7-14 días | 800 - 1500 l/ha | (Uso menor por jerarquía).<br>Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.                                                                                                                                                                                        |  |
| Apio              | Heliothis, Helicoverpa spp.<br><br>Plusia, Autographa gamma<br><br>Plusia, Chrysodeixis chalcites<br>Rosquilla negra, Spodoptera littoralis                                |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                   | Rosquilla verde, Spodoptera exigua                                                                                                                                         | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 3 | 7-14 días | 500 - 1000 l/ha | La producción podrá estar destinada al consumo de tallos y/o hojas.<br>(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).<br>Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo. |  |
| Arándano, mirtilo | Heliothis, Helicoverpa spp.<br><br>Plusia, Autographa gamma<br><br>Plusia, Chrysodeixis chalcites<br>Rosquilla negra, Spodoptera littoralis                                |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                   | Rosquilla verde, Spodoptera exigua                                                                                                                                         | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 2 | 7-14 días | 500 - 1000 l/ha | (Uso menor por jerarquía).<br>Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.                                                                                                                                                                                        |  |
| Berenjena         | Heliothis, Helicoverpa spp.<br><br>Plusia, Autographa gamma<br><br>Plusia, Chrysodeixis chalcites<br>Rosquilla negra, Spodoptera littoralis                                |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                   | Rosquilla verde, Spodoptera exigua                                                                                                                                         | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 3 | 7-14 días | 500 - 1000 l/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).<br>Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.                                                                        |  |
| Borrajá           | Heliothis, Helicoverpa spp.<br><br>Plusia, Autographa gamma<br><br>Plusia, Chrysodeixis chalcites<br>Rosquilla negra, Spodoptera littoralis                                |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                   | Rosquilla verde, Spodoptera exigua                                                                                                                                         | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 3 | 7-14 días | 500 - 1000 l/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).<br>Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.                                                                        |  |
| Cardo             | Heliothis, Helicoverpa spp.<br><br>Plusia, Autographa gamma<br><br>Plusia, Chrysodeixis chalcites<br>Rosquilla negra, Spodoptera littoralis                                |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                   | Rosquilla verde, Spodoptera exigua                                                                                                                                         | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 3 | 7-14 días | 500 - 1000 l/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).<br>Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.                                                                        |  |
|                   | Prays, polilla de los cítricos, Prays citri                                                                                                                                |               |        |           |                 | Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.                                                                                                                                                                                                                      |  |

|                                  |                                                                                                                                                                                                         |               |        |           |                 |                                                                                                                    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cítricos                         | Cacoecia, oruga del clavel, Cacoecimorpha pronubana                                                                                                                                                     | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 2 | 7-14 días | 800 - 1500 l/ha | Uso contra Cacoecia rosana.<br>Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.                   |
| Cucurbitáceas de piel comestible | Heliothis, Helicoverpa spp.                                                                                                                                                                             | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 3 | 7-14 días | 500 - 1000 l/ha | Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.                                                  |
|                                  | Plusia, Autographa gamma<br>Plusia, Chrysodeixis chalcites<br>Rosquilla negra, Spodoptera littoralis<br>Rosquilla verde, Spodoptera exigua                                                              |               |        |           |                 |                                                                                                                    |
| Espinacas y similares            | Heliothis, Helicoverpa spp.                                                                                                                                                                             | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 3 | 7-14 días | 500 - 1000 l/ha | Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.                                                  |
|                                  | Plusia, Autographa gamma<br>Plusia, Chrysodeixis chalcites<br>Rosquilla negra, Spodoptera littoralis<br>Rosquilla verde, Spodoptera exigua                                                              |               |        |           |                 |                                                                                                                    |
| Frambueso                        | Heliothis, Helicoverpa spp.                                                                                                                                                                             | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 2 | 7-14 días | 500 - 1000 l/ha | (Uso menor por jerarquía).<br>Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.                    |
|                                  | Plusia, Autographa gamma<br>Plusia, Chrysodeixis chalcites<br>Rosquilla negra, Spodoptera littoralis<br>Rosquilla verde, Spodoptera exigua                                                              |               |        |           |                 |                                                                                                                    |
| Fresal                           | Heliothis, Helicoverpa spp.                                                                                                                                                                             | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 2 | 7-14 días | 500 - 1000 l/ha | Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.                                                  |
|                                  | Plusia, Autographa gamma<br>Plusia, Chrysodeixis chalcites<br>Rosquilla negra, Spodoptera littoralis<br>Rosquilla verde, Spodoptera exigua                                                              |               |        |           |                 |                                                                                                                    |
| Frutales de cáscara              | Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella                                                                                                                                                     | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 2 | 7-14 días | 800 - 1500 l/ha | Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.                                                  |
|                                  | Orugueta, Aglaope infausta                                                                                                                                                                              |               |        |           |                 | Uso contra Archips rosanus y Archips podanus.<br>Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo. |
| Frutales de hueso                | Arañuelo, oruga hilandera, Yponomeuta spp.                                                                                                                                                              | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 2 | 7-14 días | 800 - 1500 l/ha | Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.                                                  |
|                                  | Arrollador, cigarrero, Archips spp.<br>Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella<br>Oruga de librea, Malacosoma neustria<br>Polilla oriental, Grapholita molesta<br>Viejecita, Orgyia antiqua |               |        |           |                 |                                                                                                                    |
|                                  | Arañuelo, oruga hilandera, Yponomeuta spp.                                                                                                                                                              |               |        |           |                 |                                                                                                                    |
|                                  | Arrollador, cigarrero, Archips spp.                                                                                                                                                                     |               |        |           |                 |                                                                                                                    |
|                                  | Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella                                                                                                                                                         |               |        |           |                 |                                                                                                                    |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

22423

BELTHIRUL

SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

|                                |                                                                                                                                                                                                                           |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frutales de pepita             | Oruga de librea, Malacosoma neustria                                                                                                                                                                                      |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                | Viejecita, Orgyia antiqua                                                                                                                                                                                                 | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 2 | 7-14 días | 800 - 1500 l/ha | Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.                                                                                                                                               |
| Hortalizas del género Brassica | Heliothis, Helicoverpa spp.<br>Mariposas de la col, Pieris spp.<br>Plusia, Autographa gamma<br>Plusia, Chrysodeixis chalcites<br>Polilla de las crucíferas, Plutella xylostella<br>Rosquilla negra, Spodoptera littoralis |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                | Rosquilla verde, Spodoptera exigua                                                                                                                                                                                        | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 3 | 7-14 días | 500 - 1000 l/ha | Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.                                                                                                                                               |
| Kiwi                           | Polilla arrolladora, Argyrotaenia ljungiana                                                                                                                                                                               | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 2 | 7-14 días | 500 - 1000 l/ha | (Uso menor por jerarquía).<br>Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.                                                                                                                 |
| Lechuga y similares            | Heliothis, Helicoverpa spp.<br><br>Plusia, Autographa gamma<br>Plusia, Chrysodeixis chalcites<br>Rosquilla negra, Spodoptera littoralis                                                                                   |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                | Rosquilla verde, Spodoptera exigua                                                                                                                                                                                        | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 3 | 7-14 días | 500 - 1000 l/ha | Uso en lechuga y otras ensaladas incluida Brassicacea.<br>Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.                                                                                     |
| Olivo                          | Prays, polilla del olivo, Prays oleae                                                                                                                                                                                     | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 2 | 7-14 días | 800 - 1500 l/ha | Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.                                                                                                                                               |
| Perejil                        | Heliothis, Helicoverpa spp.<br><br>Plusia, Autographa gamma<br>Plusia, Chrysodeixis chalcites<br>Rosquilla negra, Spodoptera littoralis                                                                                   |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                | Rosquilla verde, Spodoptera exigua                                                                                                                                                                                        | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 3 | 7-14 días | 500 - 1000 l/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).<br>Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo. |
| Pimiento                       | Heliothis, Helicoverpa spp.<br><br>Plusia, Autographa gamma<br>Plusia, Chrysodeixis chalcites<br>Rosquilla negra, Spodoptera littoralis                                                                                   |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                | Rosquilla verde, Spodoptera exigua                                                                                                                                                                                        | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 3 | 7-14 días | 500 - 1000 l/ha | Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.                                                                                                                                               |
| Platanera                      | Lepidópteros                                                                                                                                                                                                              | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 2 | 7-14 días | 800 - 1500 l/ha | (Uso menor por jerarquía).<br>Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.                                                                                                                 |
| Repollo                        | Heliothis, Helicoverpa spp.<br><br>Plusia, Autographa gamma<br>Plusia, Chrysodeixis chalcites<br>Rosquilla negra, Spodoptera littoralis                                                                                   |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                | Rosquilla verde, Spodoptera exigua                                                                                                                                                                                        | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 3 | 7-14 días | 500 - 1000 l/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).<br>Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div><div><div>GOBIERNO DE ESPAÑA</div></div><div><div>MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN</div></div></div> |                                          | 22423         |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                              | <div>SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA</div> <div>DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL</div> |  |
| BELTHIRUL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  |
| Tomate                                                                                                                                                                                                                                                                               | Heliothis, Helicoverpa spp.              |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plusia, Autographa gamma                 |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plusia, Chrysodeixis chalcites           |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Polilla del tomate, Tuta absoluta        |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rosquilla negra, Spodoptera littoralis   |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rosquilla verde, Spodoptera exigua       | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 3 | 7-14 días | 500 - 1000 l/ha | Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |  |
| Vid                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Polilla de la vid, Eupoecilia ambiguella |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Polilla del racimo, Lobesia botrana      | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 3 | 7-14 días | 500 - 1000 l/ha | Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |  |
| Zarzamoras                                                                                                                                                                                                                                                                           | Heliothis, Helicoverpa spp.              |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plusia, Autographa gamma                 |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plusia, Chrysodeixis chalcites           |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rosquilla negra, Spodoptera littoralis   |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rosquilla verde, Spodoptera exigua       | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 2 | 7-14 días | 500 - 1000 l/ha | (Uso menor por jerarquía). Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |  |
| Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Otros (ver condic.)                                                                                                                                           |                                          |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  |
| Berenjena                                                                                                                                                                                                                                                                            | Heliothis, Helicoverpa spp.              |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plusia, Autographa gamma                 |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plusia, Chrysodeixis chalcites           |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rosquilla negra, Spodoptera littoralis   |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rosquilla verde, Spodoptera exigua       | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 3 | 7-14 días | 500 - 1000 l/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo. |                                                                                                                                                                        |  |
| Fresal                                                                                                                                                                                                                                                                               | Heliothis, Helicoverpa spp.              |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plusia, Autographa gamma                 |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plusia, Chrysodeixis chalcites           |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rosquilla negra, Spodoptera littoralis   |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rosquilla verde, Spodoptera exigua       | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 2 | 7-14 días | 500 - 1000 l/ha | Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |  |
| Pepino                                                                                                                                                                                                                                                                               | Heliothis, Helicoverpa spp.              |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plusia, Autographa gamma                 |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plusia, Chrysodeixis chalcites           |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rosquilla negra, Spodoptera littoralis   |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rosquilla verde, Spodoptera exigua       | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 3 | 7-14 días | 500 - 1000 l/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo. |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Heliothis, Helicoverpa spp.              |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plusia, Autographa gamma                 |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plusia, Chrysodeixis chalcites           |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rosquilla negra, Spodoptera littoralis   |               |        |           |                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  |





Otras Indicaciones reglamentarias

Contiene “Bacillus thuringiensis kurstaki cepa PB54”. Es potencialmente sensibilizante por vía cutánea y por vía inhalatoria.  
El preparado no se usará en combinación con otros productos.  
EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.  
EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

OBSERVACIONES:

No se debe autorizar para los usos en jardinería exterior doméstica, ni para uso profesional en lugares destinados al público en general, en cumplimiento con el artículo 48.1 y 49.4 del Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de productos fitosanitarios.

Contiene caolín. El contenido en sílice cristalina de la fracción respirable en este formulado debe ser inferior al 0,1%.

En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.

(\*) Con respecto a los usos menores en esta propuesta de autorización; cardo, borraja, pepino, repollo, apio, perejil y berenjena, tal y como se comenta en el tercer párrafo del artículo 51.5 del reglamento (CE) 1107/2009, “La publicación oficial o, en su caso, la etiqueta incluirá una referencia a la responsabilidad de la persona que utilice el producto fitosanitario en relación con los fallos de eficacia o con la fitotoxicidad del producto para el que se haya concedido el uso menor. La ampliación del uso menor figurará de manera separada en la etiqueta.”